



Universitatea
BABEȘ-BOLYAI



RASG
Romanian Association for the
Study of Gambling

Anxietatea la jucătorii patologici de noroc adolescenți

IZABELA RAMONATODIRI ȚĂ

Psiholog clinician, psihoterapeut CBT autonom,

DRD. Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

Vice-Președinte al RASG (Romanian Association for the Study of Gambling)

e-mail: ramonatodirita@yahoo.com

Cluj-Napoca - Romania

CUPRINS



- Mecanismul de producere a unui comportament
- Comorbidități ale JPN
- Mecanismul de producere
- Emoția și comportamentul
- Fazele jocului patologic de noroc
- Etape în jocul patologic de noroc
- Metoda și procedura
- Corelația dintre anxietate și jocul de noroc
- Regresia multiplă stepwise
- Concluzii

Mecanismul de producere

Evenimentul

Gânduri

**Emoții
Comportamente**



Emoția și comportamentul

Emoții	Comportamentul – joc de noroc
Pozitive +	- pentru a distra, ascăpade plictiseală Scopul jocului este material – pentru divertisment și bani
Negative – anxietate, depresie, vinovăție, -	- pentru a scăpadeemoții negative Jocul problemă și/sau patologic de noroc
Negative disfuncționale + idee suicidare	- pentru a recupera pierderile Jocul patologic de noroc – la stadiul dorințide amuri

Fazele jocului patologic de noroc



**Faza lipsei
desperanță**

Faza pierderii

Faza câștigului

Etape întrecere a delap problem ălapatologic



Comorbidități

Jocul patologic este frecvent asociat cu tulburări anxioase regrupate în 6 entități și clinice:


1. Tulburare de panică cu sau fără agorafobie,
2. Tulburare anxioasă generalizată,
3. PTSD – mai ales la pacienți cu tipul **impulsiv**
4. TOC – JPN are un aspect obsesiv-compulsiv
5. tulburare de anxietate socială,
6. fobie specifică.

Riscul de dezvoltare a unui tablou clinic de joc patologic este de aproape **2 ori mai mare** la subiecții anxioși comparativ cu populația generală.


ȘI

1/3 dintre JPN au ADHD!!!

Distribuția subiecților




Distribuția subiecților pe SEX




	Frecv.	%
MASCULIN	98	86.7
FEMININ	15	13.3
Total	113	100.0

Distribuția subiecților pe VÂRSTE




	Frecv.	%
15	6	5.3
16	33	29.2
17	27	23.9
18	31	27.4
19	16	14.2
T	113	100.0

Distribuția subiecților pe CLASE




Clasa	Frecvența
IX	17
X	41
XI	36
XII	19
Total	113

Distribuția subiecților



Comorbiditate Anxietate - Joc



Corelația dintre Anxietate și Jocul de noroc

Correlations

		MASC TOTAL	GA Total
MASC_TOTAL	Pearson Correlation	1	.536**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	113	113
GA_Total	Pearson Correlation	.536**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	113	113

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regresia multiplă stepwise

Coeficienți ^a						
Model		R pătrat	Coef.Nestand.		Coef. Stand.	Sig.
			B	Eroarea Stand.	Beta	
1	(Ct)		18.65	.541		.000
	Anx.	.29	.071	.011	.536	.000

a. Variabilă dependentă: Jocul de noroc
Variabilă predictor: Anxietatea

În cadrul regresiei multiple stepwise am introdus anxietatea carea explicat 29% din varianța jocului de noroc ($F(1,111)=44.73, p=0.00$)

Concluzii și implicații

- Anxietatea poate duce la comportamentul de joc prin funcția acestuia de a **reduce emoția negativă**, adică prin **întărirea negativă**. Dar adesea jucătorii ajung în stări de panică, devin anxioși iar nevoia de reducere a acestei stări îi determină să apeleze din nou la jocul de noroc ceea ce îi introduce într-un **cerc vicios** spre ruina sinelui și nu numai.
- *Controlul emoțional și conștientizarea consecințelor* comportamentului de joc de noroc pot determina **jocul responsabil** și scăderea numărului de cazuri care ajung la **sinucidere**.

Bibliografie

- Belkacem, A., Reynaud, M., Jean-Luc Venise (2011) *Du plaisir du jeu au jeu pathologique - 100 Questions pour mieux gerer la maladie*, Ed. Maxima, Paris.
- Lupu, V. (2008) *Jocul patologic de noroc la adolescenti*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.